

EXTRACIONES:



- Inmediatamente despues de una extracion podra experimentar un poco de malesta. Es importante tomarce el medicamento si este ha sido resetado por el dentista.
- Poner y quitarce paquetes de hielo en los costados de su cara durante 6-8 horas. Mantener el hielo por 15 minutos y removerlo por otros 15 minutos.
- Mantener la lengua y los dedos lejos de el sitio de la extracion.
- Dieta: beba bastantes liquidos y mantenga una dieta saludable durante las primeras 24 horas.
- Sangramieto: es normal que la saliba contenga algo de sangre por los primeros dos dias. Es importante mantener una gasa despues de los primeros dos dias. Es importante mantener una gasa despues de una extracion por 30 ha 45 minutos hasta que pare de sangrar.
 - NOTA:si tiene dolor prolongo o severo, inflamacion, sigue sangrando llame inmediatamente ha su dentista.

TRATAMIENTO PERIODONTAL:

- Dieta: liquida o dieta suave por las siguiente 24 horas.
- Para dolor o molestia tome medicamento para dolor de cabeza.
- Tome bastante agua y liquidos por los siguiente 24 hrs.
- La mañana despues del tratamiento se puede enjuagar la boca con agua tibia con sal (1/2 cucharadita de sal). Si es necesario repita varias veces.
- Debido a que es muy comun que se produzca la enfermedad periodontal, los pacientes deben someterse a chequeos regulares para monitorear el progreso y prevenir la recurrencia.



CORONAS:

- Después de su primera cita para el tratamiento de la corona y el puente, generalmente se coloca una corona temporal en el diente o los dientes involucrados. La corona temporal protege mientras se está produciendo la corona personalizada. El cemento temporal se utiliza para que la corona se pueda quitar fácilmente en su próxima cita.
- Si la corona temporal se le despegas antes de su próxima cita, coloque la corona temporal en su diente y llame a nuestra oficina.
- Con su corona temporal y con su corona permanente puede experimentar alguna molestia debido a la irritación de la zona durante los procedimientos de tratamiento. También puede notar sensibilidad al frío.



ENDODONCIA:

(Tratamiento de Endodoncia)

- La terapia del canal de la raíz puede tomar 1, 2, o 3 citas dependiendo de cada caso. Es posible experimentar cualquiera de los siguientes síntomas después de cualquiera de estas citas: sensibilidad a calor y frío: sensibilidad a la presión: posible hinchazón.
- Se sellera el diente con un relleno temporalmente entre visitas.
- Trate su diente con mucho cuidado al comer hasta que la restauracion final sea colocada.
- Durante la terapia del conducto radicular, el nervio, la sangre y el suministro de nutrientes al diente se elimina. Esto hará que el diente se vuelva frágil y propenso a la fractura que puede dar lugar a la necesidad de extraer el diente. Se recomienda una corona de cobertura total para evitar que esto suceda.